

ORALSONE TOPIC

Antiinflamatorio y analgésico tópico
RUIBARBO - ÁCIDO SALICÍLICO
Indicado en aftas, llagas y lesiones bucales

Venta Libre - Industria Argentina

SOLUCIÓN TÓPICA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO:

¿QUÉ CONTIENE ORALSONE TOPIC?

Cada 100 ml de solución tópica contiene como ingredientes activos: Extracto hidroalcohólico de Ruibarbo 5 g y Ácido Salicílico 1 g.

Ingredientes inactivos: Propilenglicol, Sacarina Sódica, Ciclamato de Sodio, Propilparabeno, Metilparabeno, Glicerina, Agua Purificada, Alcohol.

ACCIÓN: Antiinflamatorio y analgésico tópico

¿PARA QUÉ SE USA ORALSONE TOPIC?

ORALSONE TOPIC se utiliza para el alivio sintomático de aftas, llagas, úlceras en la boca y encías, y lesiones bucales accidentales o debidas a prótesis defectuosas.

El Ácido Salicílico tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias y los glucósidos antraquinónicos (presentes en el Ruibarbo) tienen propiedades antisépticas y epitelizantes tópicos de la mucosa bucofaringea.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ORALSONE TOPIC?

NO USE este medicamento si es alérgico a alguno de sus ingredientes, o si está en tratamiento antialcohólico con Disulfiram.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Si las lesiones no mejoran o empeoran luego de 7 días consecutivos de tratamiento, consulte con su médico.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

En caso de infecciones bacterianas moderadas ó severas, además del tratamiento tópico, es posible que deba recibir un tratamiento prescripto por el médico.

Use solo en mucosa bucal. No debe ser aplicado en otras partes del cuerpo. Evitar contacto con los ojos.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Suspenda el uso y consulte al médico si aparecen síntomas de irritación, enrojecimiento.


¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Lea detenidamente esta información.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE APLICACIÓN:

Luego de enjuagar la boca con agua tibia, para aplicar ORALSONE TOPIC sobre las lesiones, rote el brazo articulado y presione el pulsador. Puede ser necesario presionar el pulsador 2 ó 3 veces antes que se produzca la salida del líquido. No intente agrandar el orificio de salida pues puede deteriorarse la válvula.

La aplicación de ORALSONE TOPIC se puede repetir hasta 4 veces al día, a intervalos regulares. No debe enjuagarse la boca luego de la aplicación.



¿QUÉ DEBO HACER ANTE LA INGESTIÓN ACCIDENTAL DE UNA SOBREDOSIS?

En caso de ingestión accidental de una sobredosis, concurra al hospital más cercano o llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, ó vaya al lugar más cercano de asistencia médica, ó comuníquese con alguno de los siguientes centros:

- HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 ó 4658-7777
- HOSPITAL R. GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666 ó 4962-2247

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A ORALSONE TOPIC?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor:

0800 444 72666 o, en caso necesario al teléfono de ANMAT RESPONDE: 0800 333 1234.

IMPORTANTE:

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico. Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera del alcance de los niños. No utilizar luego de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantenga el producto en su envase original y conserve el prospecto.

PRESENTACIÓN: Envase conteniendo 20 ml.

CONSERVACIÓN: Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura menor a 30 °C.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD CERTIFICADO N°: 47.423

Elaborado en Álvaro Barros 1113, B1838CMC, Luis Guillón.
Provincia de Buenos Aires.

GRAMON MILLET S.A.
Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos. Provincia de Buenos Aires.
Directora Técnica: Julia García Buhlman - Farmacéutica.

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: Diciembre 2014